

READY GERMIPLUS

Erbicida granulare pronto all'uso per tappeti erbosi e colture ornamentali

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Pendimetalin puro g 1,70
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

SCOTTS Italia S.r.l.
Via Monterumici, 8
31100 TREVISO

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 11505 del 22/11/2002

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1 - 5 - 7 - 10 - 15 - 20 - 25
PARTITA N.



IRRITANTE



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE

READY GERMIPLUS è un erbicida granulare pronto all'uso indicato per il controllo di numerose infestanti graminacee e dicotiledoni dei tappeti erbosi e delle colture ornamentali anche in vivaio.

Agisce inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli e mostra efficacia anche su infestanti già emerse purché nei primi stadi di sviluppo (graminacee allo stadio di 1-2 foglie e dicotiledoni non oltre lo stadio di 2-3 foglie vere).

Infestanti sensibili:

GRAMINACEE: Alopecurus myosuroides (coda di volpe), Apera spica-venti (agrostide annuale), Digitaria sanguinalis (digitaria), Echinochloa crus-galli (giavone comune), Lolium spp (loglio), Panicum dicotoniiflorum (panico americano), Poa spp (fienarola), Setaria spp (falso panico), Sorghum halepense da seme (sorghetta)

DICOTILEDONI: Anagallis arvensis (anagallide), Capsella bursa-pastoris (borsa pastore), Cerastium arvense (cerastio), Chenopodium spp (farinello), Diplotaxis spp (ruchetta), Fallopia convolvulus (convolvolo nero), Fumaria officinalis (fumaria), Lamium purpureum (falsa ortica), Mercurialis annua (mercorella), Papaver rhoeas (papavero), Polygonum aviculare (correggiola), Polygonum persicaria (persicaria), Portulaca oleracea (erba porcellana), Solanum nigrum (erba morella), Stachys annua (erba stregona), Stellaria media (centocchio), Veronica spp (veronica), Urtica urens (ortica piccola), Viola tricolor (viola a tre colori)

MODALITA' DI IMPIEGO

Si applica su tappeti erbosi di Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Cynodon dactylon e Zoysia matrella;

Evitare trattamenti su "Greens" e "Tee" da golf a base di Agrostis e Poa annua.

Il prodotto non deve essere applicato su tappeti appena seminati, su tappeti nuovi sin dopo l'esecuzione del quarto taglio e su tappeti sofferenti e deboli (ad esempio con crescita lenta ed irregolare).

La distribuzione dovrà essere eseguita nel modo più uniforme possibile, con l'ausilio di spandiconcimi professionali o con appositi carrelli gravitazionali, facendo seguire al trattamento una leggera irrigazione (5-10 litri/mq).

READY GERMIPLUS può essere inoltre impiegato nel diserbo di impianti di alberi e arbusti ornamentali, distribuendo il prodotto a spaglio nell'interfila o tra pianta e pianta.

EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO

Tappeti erbosi:

- in primavera e prima della germinazione delle infestanti alla dose di 6-8 kg /1.000 mq; in caso di forte infestazione ripetere il trattamento dopo 6-8 settimane

- in autunno, alla stessa dose, per impedire la germinazione di Poa annua; tappeti erbosi a base di Agrostis e Poa annua non devono essere più trattati dopo la fine di settembre.

Colture ornamentali (alberi e arbusti):

- nell'interfila (anche in vivaio) alla dose di 3-5 kg/1.000 mq e nelle stesse epoche riportate per il diserbo dei tappeti erbosi.

COMPATIBILITA': Il prodotto deve essere impiegato da solo .

Avvertenza: dopo il trattamento non arieggiare o fare tagli verticali (Verticut). Nei tappeti erbosi in cui è prevista una trasemina a metà giugno, eseguire l'intervento entro l'inizio di marzo.

Tempo di sicurezza per la trasemina: 4 mesi.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture e le epoche non indicate in etichetta. Su colture di piante ornamentali non portare il prodotto a contatto con foglie o parti verdi o tessuti non ben lignificati.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).